

**Exclusie criteria voor IC opname bij schaarste door
pandemie COVID-19**

criterium	Uitleg
Lage waarschijnlijkheid om te overleven	
Hartstilstand	Unwitnessed cardiac arrest Witnessed cardiac arrest, niet reagerend op elektrotherapie (defibrillatie of pacing) Herhaaldelijke of doorgaande hartstilstand Een tweede hartstilstand <72 uur na terugkeer van spontane circulatie
Ernstig trauma/ brandwonden	Voorspelde mortaliteit van >90%
Ernstig en irreversibel neurologisch lijden of ziektebeeld	Ernstige post-anoxische hersenschade Massaal CVA (ischemisch of bloedig) Vergevorderde, niet-behandelbare neuromusculaire /neurodegeneratieve aandoening
Korte levensverwachting	
Gemetastaseerde (hematologische) maligniteit	Overleg met oncoloog/hematoloog over ingeschatte prognose
Eindstadium orgaanfalen	Levensverwachting <1 jaar, bijv: Eindstadium hartfalen (NYHA klasse IV) Ernstige chronische longziekten (b.v. COPD) Chronische dialyse-patiënten met een contra-indicatie voor niertransplantatie Gevorderd leverfalen (MELD score >20)
Hoge biologische leeftijd (<i>niet</i> : kalenderleeftijd)	Patiënten met een hoge <i>biologische</i> leeftijd met daardoor een beperkte prognose: <i>clinical frailty score</i> ≥ 6 (z.o.z. tabel 2 voor criteria)
Gevorderd en onomkeerbaar immuuncompromitteerd	Bijv medicatie resistent AIDS, overleg met internist-infectioloog/immunoloog
Electieve palliatieve chirurgie	Ten behoeve van symptomatische verlichting bij een anders terminaal zieke patiënt, bij wie de gemiddelde levensverwachting over twee jaar <50% is

**Exclusie criteria voor IC opname bij schaarste door
pandemie COVID-19**

criterium	Uitleg
Lage waarschijnlijkheid om te overleven	
Hartstilstand	Unwitnessed cardiac arrest Witnessed cardiac arrest, niet reagerend op elektrotherapie (defibrillatie of pacing) Herhaaldelijke of doorgaande hartstilstand Een tweede hartstilstand <72 uur na terugkeer van spontane circulatie
Ernstig trauma/ brandwonden	Voorspelde mortaliteit van >90%
Ernstig en irreversibel neurologisch lijden of ziektebeeld	Ernstige post-anoxische hersenschade Massaal CVA (ischemisch of bloedig) Vergevorderde, niet-behandelbare neuromusculaire /neurodegeneratieve aandoening
Korte levensverwachting	
Gemetastaseerde (hematologische) maligniteit	Overleg met oncoloog/hematoloog over ingeschatte prognose
Eindstadium orgaanfalen	Levensverwachting <1 jaar, bijv: Eindstadium hartfalen (NYHA klasse IV) Ernstige chronische longziekten (b.v. COPD) Chronische dialyse-patiënten met een contra-indicatie voor niertransplantatie Gevorderd leverfalen (MELD score >20)
Hoge biologische leeftijd (<i>niet</i> : kalenderleeftijd)	Patiënten met een hoge <i>biologische</i> leeftijd met daardoor een beperkte prognose: <i>clinical frailty score</i> ≥ 6 (z.o.z. tabel 2 voor criteria)
Gevorderd en onomkeerbaar immuuncompromitteerd	Bijv medicatie resistent AIDS, overleg met internist-infectioloog/immunoloog
Electieve palliatieve chirurgie	Ten behoeve van symptomatische verlichting bij een anders terminaal zieke patiënt, bij wie de gemiddelde levensverwachting over twee jaar <50% is




**Exclusie criteria voor IC opname bij schaarste door
pandemie COVID-19**

criterium	Uitleg
Lage waarschijnlijkheid om te overleven	
Hartstilstand	Unwitnessed cardiac arrest Witnessed cardiac arrest, niet reagerend op elektrotherapie (defibrillatie of pacing) Herhaaldelijke of doorgaande hartstilstand Een tweede hartstilstand <72 uur na terugkeer van spontane circulatie
Ernstig trauma/ brandwonden	Voorspelde mortaliteit van >90%
Ernstig en irreversibel neurologisch lijden of ziektebeeld	Ernstige post-anoxische hersenschade Massaal CVA (ischemisch of bloedig) Vergevorderde, niet-behandelbare neuromusculaire /neurodegeneratieve aandoening
Korte levensverwachting	
Gemetastaseerde (hematologische) maligniteit	Overleg met oncoloog/hematoloog over ingeschatte prognose
Eindstadium orgaanfalen	Levensverwachting <1 jaar, bijv: Eindstadium hartfalen (NYHA klasse IV) Ernstige chronische longziekten (b.v. COPD) Chronische dialyse-patiënten met een contra-indicatie voor niertransplantatie Gevorderd leverfalen (MELD score >20)
Hoge biologische leeftijd (<i>niet</i> : kalenderleeftijd)	Patiënten met een hoge <i>biologische</i> leeftijd met daardoor een beperkte prognose: <i>clinical frailty score</i> ≥ 6 (z.o.z. tabel 2 voor criteria)
Gevorderd en onomkeerbaar immuuncompromitteerd	Bijv medicatie resistent AIDS, overleg met internist-infectioloog/immunoloog
Electieve palliatieve chirurgie	Ten behoeve van symptomatische verlichting bij een anders terminaal zieke patiënt, bij wie de gemiddelde levensverwachting over twee jaar <50% is

**Exclusie criteria voor IC opname bij schaarste door
pandemie COVID-19**

criterium	Uitleg
Lage waarschijnlijkheid om te overleven	
Hartstilstand	Unwitnessed cardiac arrest Witnessed cardiac arrest, niet reagerend op elektrotherapie (defibrillatie of pacing) Herhaaldelijke of doorgaande hartstilstand Een tweede hartstilstand <72 uur na terugkeer van spontane circulatie
Ernstig trauma/ brandwonden	Voorspelde mortaliteit van >90%
Ernstig en irreversibel neurologisch lijden of ziektebeeld	Ernstige post-anoxische hersenschade Massaal CVA (ischemisch of bloedig) Vergevorderde, niet-behandelbare neuromusculaire /neurodegeneratieve aandoening
Korte levensverwachting	
Gemetastaseerde (hematologische) maligniteit	Overleg met oncoloog/hematoloog over ingeschatte prognose
Eindstadium orgaanfalen	Levensverwachting <1 jaar, bijv: Eindstadium hartfalen (NYHA klasse IV) Ernstige chronische longziekten (b.v. COPD) Chronische dialyse-patiënten met een contra-indicatie voor niertransplantatie Gevorderd leverfalen (MELD score >20)
Hoge biologische leeftijd (<i>niet</i> : kalenderleeftijd)	Patiënten met een hoge <i>biologische</i> leeftijd met daardoor een beperkte prognose: <i>clinical frailty score</i> ≥ 6 (z.o.z. tabel 2 voor criteria)
Gevorderd en onomkeerbaar immuuncompromitteerd	Bijv medicatie resistent AIDS, overleg met internist-infectioloog/immunoloog
Electieve palliatieve chirurgie	Ten behoeve van symptomatische verlichting bij een anders terminaal zieke patiënt, bij wie de gemiddelde levensverwachting over twee jaar <50% is




Clinical frailty scale (CFS) - Dit geldt voor COVID-19, ernstig beloop, langdurige IC opname

	Classificatie	Functioneren voorafgaand aan start klachten	Criterium
1 t/m 4	Klinisch fit 	Sport regelmatig. Geen ziekteverschijnselen. Geheel zelfstandig	In dagelijks leven geen enkele hulp nodig (geen professionele zorg of mantelzorg)
5 Twijfel IC	Mildly frail 	Heeft hulp nodig bij boodschappen, koken. Beperkte loopafstand	Doet wassen en aankleden nog zelfstandig
6 t/m 8 Geen IC	Frail 	Afhankelijk voor dagelijkse zorg. Heeft hulp nodig bij alle activiteiten buitenshuis en bij het huishouden.	Hulp nodig bij wassen en aankleden.
9 Geen IC	Terminally ill	Terminale fase met een levensverwachting van < 6 maanden.	

NB vraag patiënt naar wensen voor IC opname

Bij twijfel neem contact op met ouderengeneeskunde 60559




Clinical frailty scale (CFS) - Dit geldt voor COVID-19, ernstig beloop, langdurige IC opname

	Classificatie	Functioneren voorafgaand aan start klachten	Criterium
1 t/m 4	Klinisch fit 	Sport regelmatig. Geen ziekteverschijnselen. Geheel zelfstandig	In dagelijks leven geen enkele hulp nodig (geen professionele zorg of mantelzorg)
5 Twijfel IC	Mildly frail 	Heeft hulp nodig bij boodschappen, koken. Beperkte loopafstand	Doet wassen en aankleden nog zelfstandig
6 t/m 8 Geen IC	Frail 	Afhankelijk voor dagelijkse zorg. Heeft hulp nodig bij alle activiteiten buitenshuis en bij het huishouden.	Hulp nodig bij wassen en aankleden.
9 Geen IC	Terminally ill	Terminale fase met een levensverwachting van < 6 maanden.	

NB vraag patiënt naar wensen voor IC opname

Bij twijfel neem contact op met ouderengeneeskunde 60559




Clinical frailty scale (CFS) - Dit geldt voor COVID-19, ernstig beloop, langdurige IC opname

	Classificatie	Functioneren voorafgaand aan start klachten	Criterium
1 t/m 4	Klinisch fit 	Sport regelmatig. Geen ziekteverschijnselen. Geheel zelfstandig	In dagelijks leven geen enkele hulp nodig (geen professionele zorg of mantelzorg)
5 Twijfel IC	Mildly frail 	Heeft hulp nodig bij boodschappen, koken. Beperkte loopafstand	Doet wassen en aankleden nog zelfstandig
6 t/m 8 Geen IC	Frail 	Afhankelijk voor dagelijkse zorg. Heeft hulp nodig bij alle activiteiten buitenshuis en bij het huishouden.	Hulp nodig bij wassen en aankleden.
9 Geen IC	Terminally ill	Terminale fase met een levensverwachting van < 6 maanden.	

NB vraag patiënt naar wensen voor IC opname

Bij twijfel neem contact op met ouderengeneeskunde 60559

Clinical frailty scale (CFS) - Dit geldt voor COVID-19, ernstig beloop, langdurige IC opname

	Classificatie	Functioneren voorafgaand aan start klachten	Criterium
1 t/m 4	Klinisch fit 	Sport regelmatig. Geen ziekteverschijnselen. Geheel zelfstandig	In dagelijks leven geen enkele hulp nodig (geen professionele zorg of mantelzorg)
5 Twijfel IC	Mildly frail 	Heeft hulp nodig bij boodschappen, koken. Beperkte loopafstand	Doet wassen en aankleden nog zelfstandig
6 t/m 8 Geen IC	Frail 	Afhankelijk voor dagelijkse zorg. Heeft hulp nodig bij alle activiteiten buitenshuis en bij het huishouden.	Hulp nodig bij wassen en aankleden.
9 Geen IC	Terminally ill	Terminale fase met een levensverwachting van < 6 maanden.	

NB vraag patiënt naar wensen voor IC opname

Bij twijfel neem contact op met ouderengeneeskunde 60559